B BRAUN
SHARING EXPERTISE

NOVINKA

Jedinečné řešení
pro prevenci a léčbu
inkrustací a močové infekce

Urimed® Cath + Uro-Tainer®

ŘEŠENÍ PRO PERMANENTNÍ MOČOVOU KATETRIZACI

Urimed® Cath

Permanentní močové katetry ze 100% silikonu

K materiálům doporučovaným pro dlouhodobou katetrizaci[1] patří silikon

- Katetr vyrobený ze 100% silikonu je velmi jemný, hypoalergenní a šetrný ke tkáním. Jeho povrch není opatřen potahem, a má proto relativně široký vnitřní průsvit i nižší tendenci k tvorbě inkrustací a neprůchodnosti.
- V porovnání s ostatními materiály na výrobu katetrů silikon pomáhá snížit riziko tvorby inkrustací u dlouhodobě katetrizovaných pacientů.
- Permanentní močové katetry typu Foley vyrobené ze 100% silikonu umožňují šetrnější katetrizaci a snižují riziko neprůchodnosti.[2]

Silikon versus latex

- Silikonové katetry typu Foley mají v porovnání s latexovými širší vnitřní průsvit, a lépe tak odvádějí moč.
- Ze silikonu lze procesem extruze (vytlačování) vyrobit katetr s relativně tenčími stěnami a širším lumen (při stejném vnějším průměru).

Výsledkem je, že i při menším vnějším průměru silikonových katetrů typu Foley (stupnice dle Charrièra) je odvádění moči a vyplachování účinnější díky širšímu vnitřnímu průsvitu.

Permanentní katetry z bezbarvého 100% silikonu určené ke standardnímu odvádění moči a k pooperační péči

- Katetry řady Urimed® Cath mají rtg-kontrastní hrot i tělo.

NELATON

Katetr první volby
Vhodný pro muže i ženy

Dvoucestný – pro standardní drenáž močového měchýře

TIEMANN

Usnadňuje cévkování mužů

Latex-Free
PVC-Free

Dvoucestný – pro standardní drenáž močového měchýře

Odkazy:
1 - Abrams, P., Cardozo, L., Wein, A., (Eds.).: INCONTINENCE - Fourth International Consultation on Incontinence (ICI). Paris 2009.
2 - 1997. British Journal of Urology. N. S. Morris, D. J.

Uro-Tainer®

Proplachový systém pro močové katetry

Suby G (Kyselina citronová 3,23%) CE

Pravidelné preventivní proplachování umožňuje předejít tvorbě inkrustací a zabránit neprůchodnosti katetru.

Roztok Suby G se doporučuje u pacientů, u kterých dochází opakovně k neprůchodnosti permanentního močového katetru.

Složení: kyselina citronová monohydrát 32,3 g/l; lehký oxid hořečnatý 3,8 g/l; hydrogenuhličitan sodný 7 g/l; edetan disodný dihydrát 0,1 g/l

Chlorid sodný (NaCl 0,9%) CE

Fyziologický roztok chloridu sodného se doporučuje k vyplachování buněčného detritu a hlenu.

Složení: chlorid sodný 9 g/l

PHMB (0,02 % Polihexanide) CE

Udržovací roztok pro dlouhodobě zavedené uretrální a suprapubické katétry. Uro-Tainer® Polihexanide 0,02 % se používá na běžnou dekolonizaci katétru (odstranění bakterií). Pravidelné preventivní proplachování umožňuje předejít tvorbě infekčního biofimu.

Složení: polyhexametylen biguanid (polyhexanid, PHMB) 0,02 g, Sorbitol 5,0 g, ve vodě pro injekce

Optimální kombinace. Zvolte si svůj vlastní postup!

Urimed® Cath + koncepce sběrných močových sáčků:

- Urimed B´Bags
  Sběrné močové sáčky
- Ureofix® 112® Plus
  Systém sběru moči
- Ureofix® 500
  Systém na měření hodinové diurézy
- Uro-Tainer®
  Proplachový systém pro močové katetry



Urimed® Cath + Uro-Tainer®

Produkt zobrazení (hrot/kónus)		Vnější průměr CH/FR	Kapacita balonku (ml)	Katalogové číslo	Kusů v balení
	Urimed® Cath Foley Nelaton	12	10	4563312	10
		14	10	4563314	
		16	10	4563316	
		18	10	4563318	
		20	10	4563320	
		22	10	4563322	
		24	10	4563324	
	Urimed® Cath Foley Tiemann	12	10	4563412	10
		14	10	4563414	
		16	10	4563416	
		18	10	4563418	
		20	10	4563420	

Produkt		Kód SÚKL	Katalogové číslo	Kusů v balení
	Suby G (kyselina citronová 3,23%)	5004831	FB99839	10x 100 ml sáčky
	Chlorid sodný (NaCl 0,9%)	5004830	FB99833	10x 100 ml sáčky
	PHMB (0,02 % Polihexanide)	-	FB99965	10x 100 ml sáčky

Úhradový limit: 15 ks za měsíc. Úhrada pojišťovny 50 %.

B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz